

Deux nouveaux *Ceuthorrhynchini* [COL. CURCULIONIDAE]

par A. HUSTACHE.

Ceuthorrhynchus Peyerimhoffi, n. sp. — Brièvement ovale, convexe, noir, couvert en dessus de squamules petites, oblongues, cendrées, disposées en deux rangs irréguliers sur chaque interstrie des élytres, et, en dessous, de squamules de même coloration, plus grandes et serrées.

Rostre assez épais, un peu plus long que le prothorax, médiocrement courbé, subcylindrique, très légèrement aminci vers le sommet (vu de profil), ponctué, finement strié et bien squamulé jusqu'à l'insertion antennaire, lisse, éparsément pointillé, brillant de là au sommet. Tête à ponctuation serrée, bien squamulée; front plan; vertex finement caréné; yeux grands, peu saillants. Antennes courtes, insérées vers le milieu du rostre; funicule de 7 articles, le premier beaucoup plus épais et presque du double de la longueur du 2^e, les suivants graduellement plus courts et très peu épaissis, le 7^e globuleux; massue ovoïde. Prothorax transversal, médiocrement arrondi sur les bords latéraux, assez fortement resserré derrière le bord antérieur qui est médiocrement relevé; disque assez fortement convexe, avec un sillon médian longitudinal large et profond, moins vers le milieu, une ponctuation serrée, et couvert de squamules oblongues et appliquées, analogues à celles des élytres. Élytres brièvement ovales, calus huméral peu saillant, l'apical effacé; fortement ponctués-striés; stries brillantes, imperceptiblement ponctuées, paraissant comme des raies noires et glabres; interstries plans, de la largeur des stries, finement et transversalement rugueux, avec deux rangs peu réguliers de squamules grisâtres, assez épaisses, serrées. Pygidium ponctué, couvert de squamules plus fines, allongées, serrées. Dessous du corps à ponctuation assez serrée. Pattes moyennes, finement squamulées; fémurs faiblement claviformes et inermes. Ongles brièvement dentés à la base. — Long. 2,7-2,8 mm.

♂. Une grande fossette squamulée, sur le segment anal; les 4 tibias postérieurs munis d'un très court ongle apical.

Algérie: forêt d'Aït-Ouabane dans le Djurjura, sur *Isatis djurjuruae* COSS., mai 1915. — Collections P. DE PEYERIMHOFF et HUSTACHE.

Facies de *C. interjectus* SCHULTZE, dont la nouvelle espèce est très voisine; elle en diffère par sa taille un peu supérieure, son prothorax plus court, plus large, plus relevé au bord antérieur, moins grossièrement ponctué, le sillon médian moins profond, moins net au milieu, le rostre plus court et plus épais, le revêtement formé de squamules

beaucoup plus grossières, particulièrement sur le prothorax, où la différence est frappante, et les stries élytrales moins profondes.

Phytobius Chaffanjon, n. sp. — Brun de poix rougeâtre, pattes et antennes rougeâtres; couvert en dessous de squamules cendrées peu serrées, en dessus d'une pubescence fine, cendrée, couchée; orné de trois bandes longitudinales sur le prothorax, d'une tache scutellaire blanche sur les élytres; les interstries de ces derniers en partie tuberculés.

Rostre de la longueur de la tête, épais, légèrement conique (vu de face), arqué, rugueusement ponctué, à pubescence rare, courte et soulevée. Antennes ferrugineuses, courtes; funicule de 6 articles.

Tête rugueusement ponctuée; yeux saillants. Prothorax faiblement transversal, très peu resserré derrière le bord antérieur qui est tronqué, bidentulé; l'intervalle entre les denticules plus de moitié aussi large que le front entre les yeux; bords latéraux sinueux, médiocrement convergents en avant, armés d'un fort tubercule triangulaire un peu en arrière du milieu, non sur le bord lui-même, mais en dedans de celui-ci, presque parallèles en arrière; base bisinuée; disque peu convexe, à ponctuation médiocre, confluyente, couvert d'une pilosité extrêmement fine et de quelques squamules cendrées, condensées en une ligne médiane et deux bandes latérales plus larges, échancrées par les tubercules. Élytres en ovale régulier, plus larges que le prothorax à la base; calus huméral peu saillant, l'apical effacé; stries assez profondes, ponctuées, finement pubescentes; interstries de la largeur des stries, faiblement convexes, à rugosités transversales fines et serrées, et, en outre, les 3^e, 5^e, 6^e et 7^e avec trois à cinq tubercules aigus, placés sur leur moitié postérieure. Disque assez convexe, revêtu d'une fine pubescence cendrée, couchée et peu serrée; une macule blanche sur la base de la suture. Dessous du corps ponctué, couvert de squamules cendrées, éparses sur l'abdomen, un peu plus serrées sur la poitrine et plus encore dans l'angle thoraco-élytral. Pattes rougeâtres, ponctuées, finement squamulées; fémurs inermes; tibias rembrunis à l'extrême sommet; tarses robustes et courts; ongles dentés. — Long. 2.2 mm.

Mandchourie : entre Ourga et Tsitsikhar (J. CHAFFANJON). Un exemplaire faisant partie des collections du Muséum de Paris.

Voisin de *P. quadrinodosus* Fährs; s'en distingue par ses yeux plus saillants, son prothorax plus court, l'échancrure du bord antérieure plus large, presque rectiligne, les denticules beaucoup plus petits, la ponctuation beaucoup moins forte et moins profonde, par la

forme plus large de ses élytres dont les bords latéraux sont plus fortement cintrés; ce dernier caractère le différencie sûrement de *C. Hartmanni* Schultze; d'après la description de l'auteur, *C. Hartmanni* a la ponctuation du prothorax plus forte, plus profonde, son bord antérieur plus relevé et plus profondément échancré que *P. quadrinodosus*, caractères qui ne conviennent pas à *P. Chaffanjonii*.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain
(Vingt-deuxième note) ⁽¹⁾ : Récoltes de M. le Dr H. FOLEY
dans l'extrême Sud-Oranais

par P. DE PEYERIMHOFF.

Par l'aimable entremise de M. le Dr Edm. SERGENT, Directeur de l'Institut Pasteur d'Alger, j'ai reçu quelques Coléoptères recueillis en mars et avril 1913 par M. le Dr H. FOLEY, au cours de ses explorations dans la vallée de la Saoura, le Grand Erg occidental et la région du Touat. On en trouvera la liste plus loin.

Cette très intéressante série renferme trois espèces inédites, dont un genre nouveau :

Tenebrionidae.

66. **Foleya** (2), *Erodiinorum* nov. gen. — *Caput porrectum, clypeo haud lobato, antice emarginato, oculis magnis, oratis, mandibulis minutis, fere occultatis, antennis brevissimis, vir claratis, articulo ultimo apice excepto nudo, haud cucullato. Pronotum valde transversum, linea marginali versus basin ecanida. Scutellum minimum. Coleopterorum ad apicem vir resteriorum linea pleuralis integra. — Corpus facie Piestognathi, maris prosterno barbigerio.*

Foleya brevicornis, n. sp. (♂). — Long. 9 mm.; lat. 4,5 mm. — *Elongato-ovata, pulvinata, prothorace excepto opacula, nigra, lubro, palpis tarsisque brunneo-rufis. Caput opacum, fere longius quam latius,*

(1) Pour les notes 1-14 et 16-21, voir ce *Bulletin* [1905-1915]. — Quinzième note, in *Ann. Soc. ent. France*, [1912], p. 515. — La 13^e note (Récoltes de M. le Dr Edm. SERGENT dans l'extrême Sud-Oranais) concerne une région presque identique à celle parcourue par le Dr FOLEY.

(2) Dédié à M. le Dr H. FOLEY, actuellement médecin-chef de l'hôpital Maillot, à Alger.